NOTE VI.

NOVA SPECIES BUPRESTIDARUM.

DESCRIPSIT

J. R. H. NEERVOORT van de POLL.

Trachys Frenchi, v. d. Poll.

Parva, *cuneiformis*, *nitida*, *supra laete aureo-aenea*, *regulariter sparsimque punctis setiferis tecta (setae longae aurescentes)*, *subtus nigro-aenea; elytra lateraliter costata.* — Long. 2—2$^2/_5$ mm., larg. 1$^1/_3$—1$^1/_2$ mm.

Caput inter oculos paullo excavatum, in vertice sparsim punctatum. *Prothorax* brevis, latus, antice valde oblique angustatus; lateribus fere rectis, angulis posticis nonnihil intus directis, retrorsum prominentibus, acutis; ad basin fortiter bi-sinuatus, in medio late lobatus (lobus ante scutellum arcu emarginatus); regulariter punctatus, singula puncta setifera capitis thoracisque orbiculo inscripto circumdata. *Scutellum* sat magnum, triangulare. *Elytra* subdepressa, prothoracis base paullisper latiora, ad humeros modice rotundata, apicem versus gradatim attenuata, ad apicem late et conjunctim rotundata; lateraliter costa valida acuta instructa; punctis grossis setiferis sat dense obtecta, infra scutellum plaga magna glabra notata. *Pars infera* punctis aliquot, orbiculis vel arculis circumdatis, instructa; *prosternum* breve, latissimum; *metasternum* in medio annulum subovale elevatum ferens.

Haec species mihi videtur *T. setosulae* H. Deyr. affinis.

Habitat Queensland bor. — Haec est prima species generis *Tracheos* Australiensis, nuperrime transmissa ab entomologo diligentissimo French, in cujus honorem ei dedicavi.